

منشور إلى

السادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية حول الإجراءات المحيطة لمكافحة حافرة الطماطم (*Tuta absoluta*)

الموضوع: تحيين المنشور عدد 138 بتاريخ 03 أكتوبر 2011.
المرجع: جلسة عمل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة حشرة حافرة الطماطم والمحدثة بمقرر السيد وزير الفلاحة عدد 2073 بتاريخ 22 جوان 2009.
المصاحب: جدول نموذجي.

في إطار العمل على مواصلة مكافحة حشرة حافرة الطماطم للحد من خطورتها وأضرارها في مزارع الطماطم، تقرر تحيين التوصيات المدرجة سابقا في هذا المجال، حيث يتعين على المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية دعوة منتجي الطماطم إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

- الحرص على استعمال شتلات سليمة من الإصابة بالحشرة،
- ترك مسافة أمان بـ 1000 متر على الأقل بين البيوت الحامية والزراعات الحقلية،

- قلع وإتلاف الأعشاب الضارة العائلة للحشرة أثناء الموسم، خاصة تلك التي تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات (Solanacées)،

- إزالة الأوراق المصابة بعملية التوريق (Effeillage) ووضعها في أكياس مغلقة لمدة 3-4 أسابيع على الأقل قبل إتلافها،

- الحرص على وضع ناموسيات 5×8 أو 6×8 على الأقل بالنسبة للبيوت المعدة للإنتاج و16×20 أو 10×20 بالنسبة للمنابت في الأبواب وفي كلّ فتحات التهوية للبيوت الحامية وتركيز أبواب مزدوجة (SAS)، مع التذكير أن هذه الناموسيات مدعمة بنسبة 30% وفي حدود 140 دينارا/500 م²،

- تركيز مصائد فيرومونية للرصد بمعدل 2 مصائد/هكتار بالزراعات الحقلية (كبسولات مجانية تستبدل مرة واحدة طيلة فترة الزراعة) و1 مصيدة/500 م²

للمرصد والمكافحة داخل البيوت الحامية (كبسولات مجانية تستبدل أربعة مرات طيلة فترة الزراعة) والقيام بالمراقبة الدورية لتعداد الفراشات المصطادة،
- بالنسبة إلى الزراعات الحقلية وعند الوصول إلى معدل 30 فراشة/مصيصة/أسبوع، يجب الترفيع في عدد المصائد إلى 30 مصيدة/هك وذلك مباشرة في المناطق الساحلية والوسط وتدرجيا في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي. وتقوم فاعلية كبسولة الفيرومومون حوالي 4 أسابيع، على أن تحفظ قبل استعمالها في درجة حرارة بين 4 و 10°س. بذلك تكون جملة الكبسولات المستعملة للمكافحة خلال موسم واحد 60 كبسولة/هك توزع بصفة مجانية على المنتفعين،

- بعد تركيز المصائد للمكافحة وعندما يصل عدد الحشرات أو يفوق 30 فراشة/مصيصة/أسبوع أو عندما تظهر أولى أعراض الإصابة على النباتات، يتم الانطلاق في المداواة بالمبيدات الحشرية المنصوح بها مع العمل على تداولها مثلما هو مبين بالمطويات الصادرة في الغرض، ويجب البدء باستعمال المبيدات البيولوجية مرتين على الأقل (Spinosade، Azadiracthine، Bacillus thuringiensis)، قبل الشروع في استعمال المبيدات الكيميائية،
- الحرص على مواصلة المداواة ضد الآفات الأخرى بالمبيدات المرخص فيها، مع إمكانية مزجها بالمبيدات الخاصة بحافرة الطماطم، علما وأن المبيدات التالية صالحة ضد حافرة الطماطم وكذلك ضد:

■ الفراشات الليلية: Indoxacarbe و Emamectine Benzoate و Spinetoram

■ الذبابة الحافرة: Spinosade و Cyromazine

■ الذبابة البيضاء: Azadiracthine

■ الذبابة البيضاء والأكاروسات: Diafenthiuron

- إبقاء المصائد الفيرومونية بعد الجني داخل البيوت الحامية وتأجيل إزالة الغطاء البلاستيكي أكثر ما يمكن من الوقت ثم القيام بحرث الأرض،
- إبقاء المصائد الفيرومونية في حقول الطماطم بعد الجني إلى حين حرث الأرض الذي يجب الإسراع به.

هذا، وإحكام متابعة تطوّر الحشرة في زراعات الطماطم، المطلوب موافاة الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بتقرير أسبوعي حول الوضع وذلك حسب الجدول النموذجي المصاحب دون سواه.

ونظرا للأهمية الكبرى لهذا الموضوع، فإن السادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد وضع هذه التوصيات حيز التنفيذ.

والسلام

مختار الفلاحية
محمد بنيس الم

